

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

FEROMATE™: producto fabricado con feromonas sexuales de insectos, para el control de *Lobesia botrana*. No tiene acción sobre otras especies. Por su modo de empleo y características, este producto no representa riesgos para el ser humano, ni animales de sangre caliente.

Se debe evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Dañino si este es ingerido. Puede causar irritación ocular moderada. Al manipularlo, se exige el uso de guantes resistentes a productos químicos. Después del tratamiento, lávese bien con agua y jabón antes de comer, beber, usar tabaco o ir al baño.

LEA CON CUIDADO EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA MAYOR EFECACIA.

INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.

SI EN LA PIEL: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel por 20 minutos con agua. Busque ayuda médica si es necesario.

SI EN OJOS: Enjuague con agua durante 20 minutos con los ojos abiertos. Busque ayuda médica si es necesario.

PELIGROS AMBIENTALES:

NO aplique al agua ni contamine el agua al desecharla.

ALMACENAMIENTO: Almacene el producto en el paquete en un lugar seco a una temperatura inferior a 5°C., tiempo de conservación 2 años. Para evitar la contaminación, guárdelo solo en lugares que no se utilicen para alimentos y agua.

DISPOSICIÓN: Deseche adecuadamente, NO contamine el agua y los alimentos por eliminación. NO reutilice el contenedor de este producto.

DOSIS: 550 emisores por hectárea, ofreciendo un período de protección de 150 días por aplicación. Cada emisor o dispensador posee 183,6 mg de ingrediente activo.

RECOMENDACIÓN: Reforzar los bordes del huerto especialmente los sectores de donde proviene el viento, con un 5 % más de emisores.

Evitar enrollar los emisores en alambres.

No apretar excesivamente.

No dejarlos expuestos al sol.



Ingredientes activos:
E, Z-7,9-DODECADIEN-1-YL ACETATO.....73,5%

Ingredientes inertes:
Otros ingredientes.....26,5%

183.6 mg de ingredientes activos por dispensador
NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

550 DISPENSADORES

PRECAUCIÓN
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS SIEMPRE
SOLICITAR LO INDICADO

Importa:
FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO FRUTICOLA



Los Coigues 651, Quilicura
(Santiago de Chile) Chile
WWW.FDF.CL

Distribuye:
ANASAC CHILE S.A



Almirante Pastene 300 Providencia
(Santiago de Chile) Chile
www.anasac.cl

**NO
INGERIR**

**USAR
GUANTES**

**LAVARSE
LAS MANOS**



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

Es importante seguir las instrucciones y aplicar según se indica al usar este producto.

HOSPEDADORES: Uva de mesa y vinífera (*Vitis vinífera*), arándano (*Vaccinium corimbosum*) y ciruela (*Prunus domestica*).

APLICACIÓN: Gire los dispensadores alrededor de las ramas o vides de la planta huésped, en la parte superior del dosel de la planta. Los dispensadores se deben aplicar de manera uniforme y uniforme en el área tratada para los resultados de la interrupción.

Aplicar antes de la aparición de la polilla de la vid europea en la primavera. Antes de la aplicación, controle con trampas de feromonas en los sitios host.

UBICACIÓN: Se instalan amarrados como lazo, a la altura del racimo en la madera del año o del año anterior.

PRECAUCIONES: Se pueden proteger adecuadamente con el método de la confusión sexual viñedos y parronales con baja población. En presencia de media o alta población es necesario, durante el primer año de aplicación, contemplar una estrategia combinada con insecticida. Sobre todo, al inicio de la estación predisponer tratamientos adecuados para reducir las poblaciones y combinar los efectos para mejor control. El uso de insecticidas no perjudica el funcionamiento de los emisores, por eso es posible intervenir en cualquier momento.

PERIODO DE CARENCIA:

No presenta por ser feromona, está exenta de tolerancia.

TIEMPO DE REINGRESO:

No corresponde por la naturaleza del producto.

INCOMPATIBILIDAD:

No corresponde por ser estos dispositivos de instalación.

FITOTOXICIDAD:

No corresponde por ser estos dispositivos de instalación.

NOTA: Los dispensadores de interrupción de apareamiento FEROMATE™ se usan mejor en áreas de más de 2 hectáreas, las áreas tratadas deben ser uniformes y contiguas. Se recomiendan aplicaciones suplementarias de plaguicidas cuando las áreas tratadas tienen una gran población de plagas objetivo. Reforzar los bordes del HUERTO, especialmente los sectores desde donde proviene el viento, con un 5% más de emisores. Evitar enrollar los emisores en alambres, no apretar excesivamente, no dejarlos expuestos al Sol. Consulte a los especialistas locales en protección de plantas o al representante de FDF para conocer el tiempo y el control de la población.