

HERBICIDA

BRIOSO 750 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 3548

BRIOSO 750 EC, es un herbicida, que actúa mediante la inhibición de la biosíntesis de lípidos, recomendado para el control las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Molinato (*).....	75% p/v (750 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100% p/v (1 l)

* Azepan-1-carbotioato de S-etilo

<< LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N° :

Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300 - Providencia
Santiago - Chile

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa - CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County ZIP: 324400
ZHEJIANG, CHINA.

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

MOLINATO, es un herbicida perteneciente al grupo químico de los tiocarbamatos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado emulsionable, usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

BRIOSO 750 EC, es moderadamente tóxico para microcrustáceos acuáticos, ligeramente tóxico para peces y aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>> <<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >> << LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>> << NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>> << NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>> << PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Instrucciones para el Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático. **Primeros auxilios:** En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con agua fría y jabón. En caso de contacto ocular: si el producto ingresó a los ojos lavarlos con agua fría, por al menos 15 minutos, intentando que los párpados estén bien abiertos. En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si se presenta falla respiratoria, aplique respiración artificial. En caso de ingestión: Lave con agua la boca para remover restos del producto, dar a beber 2 tazas de agua y NO PROVOCAR EL VÓMITO. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

Síntomas de Intoxicación: Salivación, náuseas diarrea y dolor abdominal. Cefalea, somnolencia y vértigo.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 – (CORPORACION RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve **BRIOSO 750 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

BRIOSO 750 EC es un herbicida selectivo, de post-emergencia para el control de hualcacho en el cultivo de arroz. Es absorbido principalmente por los tallos en emergencia y en parte por las raíces, actuando a nivel de nudo coleoptilar o de crecimiento del brote.

Instrucciones de uso

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Arroz	Hualcacho (<i>Echinochloa spp</i>)	6	En Post-emergencia aplicar vía aérea o terrestre con lámina de agua de 5 a 10 cm. aproximadamente, dependiendo del tamaño del Hualcacho que debe tener como máximo de 10 a 15 cm de altura (estado aprox. de 2 hojas) y sumergido por lo menos 2/3 de su follaje. Dejar el agua detenida y reiniciar la circulación a los 4 días después de la aplicación.

- Utilizar entre 50 - 200 L de agua/ha, dependiendo del equipo pulverizador.
- Aplicar solo 1 vez por temporada

Preparación de la mezcla:

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **BRIOSO 750 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo agitación constante.

Compatibilidad:

BRIOSO 750 EC es compatible con la mayoría de los herbicidas, insecticidas y fungicidas de uso común. En todos los casos se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

Incompatibilidad:

BRIOSO 750 EC es incompatible con la mayoría de los herbicidas, insecticidas y fungicidas de reacción alcalina.

Fitotoxicidad:

BRIOSO 750 EC no es fitotóxico para el arroz, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta. No aplicar en cultivos distintos al arroz.

Tiempo de reingreso:

No corresponde por las características del cultivo, tanto para personas como animales.

Clasificación HRAC: Grupo N. Inhibición de la síntesis de los lípidos (no ACCasa)

Carencia:

No corresponde.



NOCIVO

