

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

LEGUFEN® 250 SL, herbicida cuyo ingrediente activo Fomesafeno pertenece al grupo químico de los Difenil Éteres. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado soluble usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información ecotoxicológica: LEGUFEN® 250 SL es prácticamente no tóxico para aves y abejas, moderadamente tóxico para microcrustáceos acuáticos y peces y muy tóxico para algas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>
<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO >>

Instrucciones para Triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen de agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Al finalizar el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar inmediatamente al centro hospitalario más cercano llevando la etiqueta o el envase del producto.

Síntomas de intoxicación: Irritación ocular, irritación conjuntival, irritación dermal, irritación del tracto respiratorio y de la mucosa oral, dolor abdominal, vómitos, inflamación, daño esofágico con edema y posible necrosis.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>


Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve LEGUFEN® 250 SL, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.



NOCIVO

LEGUFEN® 250 SL

**HERBICIDA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.643

LEGUFEN® 250 SL, es un herbicida selectivo, de contacto. Controla malezas de hoja ancha en post emergencia en los cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

| | |
|--|-------------------|
| Fomesafeno (*) | 25% p/v (250 g/l) |
| Cofomulantes, c.s.p. | 100% p/v (1 l) |
| (*) 5-(2-cloro- α,α -trifluoro-polioloxi)-N-mesil-2-nitrobenzamida | |

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha de vencimiento:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA – CHILE

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC
CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County,

Zhejiang, China, ZIP 324400

HEFEI XINGYU CHEMICAL CO. LTD.

Cyclic Economic Industrial Zone,
Feidong County, Hefei, R.P. China

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

LEGUFEN® 250 SL, herbicida cuyo ingrediente activo Fomesafeno pertenece al grupo químico de los Difenil Éteres. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado soluble usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información ecotoxicológica: LEGUFEN® 250 SL es prácticamente no tóxico para aves y abejas, moderadamente tóxico para microcrustáceos acuáticos y peces y muy tóxico para algas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>
<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO >>

Instrucciones para Triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen de agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Al finalizar el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar inmediatamente al centro hospitalario más cercano llevando la etiqueta o el envase del producto.

Síntomas de intoxicación: Irritación ocular, irritación conjuntival, irritación dermal, irritación del tracto respiratorio y de la mucosa oral, dolor abdominal, vómitos, inflamación, daño esofágico con edema y posible necrosis.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>


Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve LEGUFEN® 250 SL, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.



NOCIVO

LEGUFEN® 250 SL

**HERBICIDA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.643

LEGUFEN® 250 SL, es un herbicida selectivo, de contacto. Controla malezas de hoja ancha en post emergencia en los cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

| | |
|--|-------------------|
| Fomesafeno (*) | 25% p/v (250 g/l) |
| Cofulantes, c.s.p. | 100% p/v (1 l) |
| (*) 5-(2-cloro- α,α -trifluoro-poliiloxi)-N-mesil-2-nitrobenzamida | |

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha de vencimiento:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA – CHILE

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC
CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County,

Zhejiang, China, ZIP 324400

HEFEI XINGYU CHEMICAL CO. LTD.

Cyclic Economic Industrial Zone,

Feidong County, Hefei, R.P. China

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO

Legufen® 250 SL es un herbicida selectivo, de contacto, recomendado en cultivos de poroto y soya, para el control en post emergencia de las malezas de hoja ancha indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de instrucciones de uso:

| Cultivo | Malezas | Dosis (L/ha) | Observaciones | Carencia (días) |
|---|---|--------------|---|-----------------|
| Poroto (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Soya (<i>Glycine max</i>) | Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Bledo (<i>Amaranthus spp.</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>), Chamico (<i>Datura spp.</i>), Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Malvilla (<i>Anoda cristata</i>), Pasto negro (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Yuyo (<i>Brassica campestris</i>) | 1,0 - 1,5 | Aplicar preferentemente en post emergencia temprana, sobre malezas de 2 a 4 hojas y 2 a 4 cm de altura. Las malezas y el cultivo deben estar en activo crecimiento. Se recomienda aplicar sobre suelo húmedo. | 40 |

Instrucciones de uso:

- Aplicar una vez por temporada.
- Se recomienda aplicar con algún surfactante no iónico.
- Volumen de agua sugerido para la aspersión: 150 a 200 L de agua/ha.
- No aplicar sobre malezas cubiertas con tierra ni con temperaturas sobre 30°C.
- No aplicar cuando las malezas se encuentren bajo condiciones de estrés.
- Esperar 7 días entre la aplicación de Legufen® 250 SL y la aplicación de otro herbicida.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora. Usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario.
- No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.
- Usar dosis mayor con presiones medias a altas de malezas y dosis menor con presiones bajas.

Consideraciones rotacionales: Después de una aplicación de **Legufen® 250 SL**, se debe esperar 4 meses para la siembra de cereales de invierno y 7 meses para la siembra de otros cultivos.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **Legufen® 250 SL** y luego completar con agua hasta el volumen final requerido, manteniendo agitación constante. Preparar y aplicar siempre con agitador funcionando.

Compatibilidad: Puede mezclarse con un surfactante no iónico.

Incompatibilidad: En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Esperar 7 días entre la aplicación de **Legufen® 250 SL** y la aplicación de otro herbicida.

Fitotoxicidad: **Legufen® 250 SL** no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 24 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

Clasificación HRAC: Grupo E (14), inhibición de la protoporfirina oxidasa (PPO).

Familia química: Difenil Éteres.

Bajo ciertas condiciones, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o cambios en la sensibilidad a herbicidas. Esto puede ocurrir a través de una variación genética normal en cualquier población de malezas y llegar a afectar a **Legufen® 250 SL** como a otros grupos de su mismo grupo químico. Estas razas resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de herbicidas y la población será de difícil control con estos productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes o menos sensibles es difícil de detectar antes de la aplicación de **Legufen® 250 SL**, por lo que Anasac no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de éstas. En caso de duda, consultar a nuestro departamento técnico o a algún especialista.



NOCIVO

