

RANGO® 75 WG

HERBICIDA

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.458

RANGO® 75 WG, es un herbicida sistémico no selectivo recomendado para el control postemergente de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

RANGO® 75 WG, no es volátil y no tiene efecto residual en el suelo.

COMPOSICIÓN :

* Glifosato-monoamonio.....	74,7% p/p (747 g/Kg)
Coformulantes c.s.p.....	100% p/p (1 Kg)
* Sal monoamónica de N-(fosfonometil)glicina (Equivalente a 67,9% p/p (679g/kg) de glifosato)	

<< LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300- Providencia, SANTIAGO - CHILE

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE.

HANGZHOU MARCH CHEMICALS CO. LTD.

Room 504, Building N° 1 of Gemini International,
1785 Jiangnan Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, R.P. China

HUALONG CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.

1701 Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road, Hangzhou, China

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longyou County, Zhejiang, China, ZIP 324400

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

RANGO® 75 WG, herbicida no selectivo en base a glifosato-monoamonio, perteneciente al grupo químico de los organofosfonatos.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma.

Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de gomas.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.

Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

RANGO® 75 WG, es prácticamente no tóxico a peces, aves y microcrustáceos acuáticos. Virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. Si el afectado no respira otorgar respiración artificial.

En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

En todos los casos trasladar al afectado al centro hospitalario más cercano llevando la etiqueta o envase del producto.

Síntomas: Irritación cutánea y ocular. Irritación del sistema gastrointestinal, náuseas, vómitos.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **RANGO® 75 WG**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca Registrada de Agrícola Nacional S.A.C. e I.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO :

RANGO® 75 WG, herbicida sistémico no selectivo recomendado para el control postemergente de malezas anuales y perennes, gramíneas, hojas ancha y arbustivas, mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de uso:

USO	DOSIS SEGUN MALEZA PREDOMINANTE
<p>Almendra, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Nectarino, Manzano, Membrillo, Nogal, Olivo, Palto, Peral, Vid, Kiwi, Limonero, Lima, Naranja, Pomelo, Mandarino, Tangerina, Tangelo, Níspero, Caqui, Frambuesa, Arándano, Mora, Zarparrilla: Aplicación dirigida a las malezas emergidas, evitando mojar por deriva el follaje de los árboles los troncos verdes no lignificados y/o brotes nuevos. Es compatible con herbicidas residuales. Generalmente el control de malezas anuales en un huerto frutal, parronal o viñedo se complementa en invierno con aplicaciones de herbicidas suelo-activo o residuales. Carencia N.C.</p> <p>Cero y Mínima labranza: Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Triticale, Maíz, Arroz, Arveja, Haba, Frejol, Garbanzo, Lenteja, Lupino, Raps, Espárrago, Papa, Remolacha, Lechuga, Espinaca, Sandía, Melón, Zapallo, Zanahoria, Tabaco, Betarraga, Ajo, Cebolla, Brócoli, Repollo, Tomate, Pimiento, Alcachofa. También en frutales, frutales menores y cultivos ornamentales. Aplicar previo a la siembra o plantación. En cero labranza se aplica inmediatamente previo a la siembra o al mismo tiempo de la siembra. No afecta la germinación de la semilla en el cultivo y asegura su establecimiento. En mínima labranza se aplica a lo menos 7 días antes del uso de maquinaria de preparación del suelo y siembra o plantación, con el objetivo de permitir una buena traslocación y acción sobre órganos de reproducción vegetativa. Carencia: NC.</p> <p>PREPARACION SITIO FORESTAL: Aplicar previo al establecimiento o plantación de eucaliptus, sólo o mezclado con herbicidas residuales. Chequear selectividad del producto complementario para no dañar la especie forestal. En aplicaciones de post-plantación mojar sólo las malezas, nunca la especie forestal. En control de tocones forestales aplicar Rango® 75 WG en dosis de 5-7%, inmediatamente de efectuado los cortes, para permitir la penetración del producto. Carencia: NC</p> <p>Bordes de Canales En limpieza de canales aplicar sobre los bordes en dirección contraria a la corriente del agua, o mejor secar el canal y aplicar. Se recomienda mezclar RANGO® 75 WG al 3-4%. Carencia: NC</p>	<p>Gramíneas anuales: Ballica, Avenilla, Poa, Piojillo, Cola de zorro, Hualcacho, Pata de gallina, Pega-pega, Pasto del perro, Bromo, Tembladera, Tembladerilla, Vulpia, Cola de ratón. Dosis: 0.75-1.5 kg/ha. Asperjar sobre la maleza después de un riego con la maleza tierna en activo crecimiento y antes de la floración, todo el año. Preferentemente en primavera-verano y otoño</p> <p>Gramíneas perennes: Chépica o pasto quila y pasto cebolla: 1.0 – 1.5 kg/ha. Maicillo: 1.5-2.0 kg/ha. Chépica gigante: 2.0-2.5 kg/ha Pasto bermuda: 2.5-3.0 kg/ha. Aplicar con maicillo de 20-30 cm de altura y en el caso de la chépica antes que los estolones alcancen 30 cm de crecimiento.</p> <p>Hoja ancha anuales: Amor seco, Bledo, Bolsita del pastor, Cardo, Chamico, Hierba cana, Senecio, Yuyo, Manzanilla, Enredadera, Ortiga, Quinguilla, Sanguinaria y Verdolaga. Dosis: 1 a 2 kg/ha. Aplicar de preferencia a inicios de floración, época de mayor susceptibilidad de las malezas.</p> <p>Otras malezas perennes: Achicoria, Falso té, Rábano, Siete venas: 1.5-2.0 kg/ha Galega, Junquillo y Hierba azul: 2.0-3.0 kg/ha Chufa o coquillo: 2.5-3.0 kg/ha Correhuela, Retamillo, Totor, Zaramora: 3.0-4.0 kg/ha Aplicar con la chufa de 9 a 10 hojas, aproximadamente 30 días después de la emergencia y repetir a los 40 días. En zaramora aplicar desde la floración hasta el fin de la maduración del fruto.</p> <p>Malezas arbustivas: Aromo, Ulex, Espinillo, Maqui, Boldo, Litre, Roble, Quillay y Rosa Mosqueta. Dosis 3.0-5.0 kg/ha. Aplicar próximo a la floración de malezas.</p>

Instrucciones de uso:

- Usar dosis menor con malezas más sensibles a glifosato y en sus primeros estados de desarrollo y dosis mayor con malezas de menor susceptibilidad a glifosato y que se encuentren con un mayor estado de desarrollo.
- Se aplica selectivamente a la maleza en época de mayor susceptibilidad, generalmente próximo a la floración.
- Si hay rebrote se vuelve a aplicar en estado susceptible, las veces que sea necesario para exterminar la maleza.
- **RANGO® 75 WG** es sistémico y actúa sólo sobre la maleza presente al momento de la aplicación. La maleza muere en el transcurso de 7 a 20 días dependiendo de la temperatura, dosis aplicada y estado de la maleza.
- Reinfestación de malezas puede ocurrir a los 20 a 45 días.
- No debe aplicarse al suelo ni al agua de riego o tranques, pozos y lagunas.
- No aplicar si se pronostican lluvias dentro de 6 horas.
- No segar o cortar la maleza antes ni después del tratamiento.
- No aplicar en maleza estresada por falta o exceso de agua, pisoteada por animales o maquinaria, cortada o deteriorada, ya que no se obtendrá control eficiente.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 30°C, idealmente temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- Evitar aplicar sobre follaje mojado o con tierra.
- Aplicar con equipos convencionales volúmenes de 100 a 200 lt de agua/ha. Si se emplean equipos de gota controlada o CDA, se pueden reducir las dosis hasta 50% y el volumen de agua a 15-20 lt/ha.
- Aplicar un máximo de 12 veces por temporada con un intervalo de 20 días como mínimo.

Preparación de la mezcla: Medir la dosis de **RANGO® 75 WG** y diluir en el estanque del equipo aplicador con el agitador en marcha y terminando de completar con agua según requerimiento. Mantener el agitador funcionando para asegurar una mezcla homogénea durante la aplicación.

Compatibilidad: Es compatible con AJAX 50 WP.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad: Las aplicaciones deben ser dirigidas únicamente a la maleza emergida en pleno crecimiento. No mojar el follaje de frutales, vides o cultivos donde resulta fitotóxico. Por lo tanto, la aplicación debe ser selectiva.

Tiempo de reingreso: 4 horas para reingreso al sector tratado para personas y animales.

Clasificación HRAC: Grupo G; inhibición de EPSP sintetasa.



CUIDADO

