

SuMagic® 5 SC

Fitorregulador – Suspensión Concentrada (SC)

Fitorregulador utilizado para disminuir el crecimiento vegetativo y mejorar la forma y calidad del fruto, favoreciendo el aumento de rendimiento en Paltos y Nogales.

Composición:

Uniconazol-p*.....5% p/v (50 g/l)

Coformulantes, c.s.p.....100% p/v (1 l)

*(E)-(S)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H,1,2,4-triazol-1-il)-pent-1-em-3-ol

Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4233

Contenido neto: 5 Litros

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Fabricado por: **Adama Agan Ltd**
Northern Industrial Zone P.O.B.
262 Ashdod 77102, Israel

Distribuido por: **ANASAC CHILE S.A**
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Importado por:

♦ **SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.**
Av. Kennedy 5735 Of 1601
Las Condes, Santiago-Chile
Fono: (56)228350500

© Marca Registrada

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• Uniconazol-p pertenece al grupo químico de los triazoles. • Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Conservar en su envase de origen y bajo llave. • Durante la manipulación, use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla y antiparras. • Durante la aplicación, use guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, mascarilla y antiparras. • No comer, no fumar ni beber durante el uso del producto. • No aplicar con viento y no trabajar en la neblina de la aplicación. Aleje animales y personas extrañas. • Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

Síntomas de intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sudor, salivación, opresión en el pecho, visión borrosa y malestar general. El producto puede resultar irritante a los ojos.

Primeros Auxilios:

Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al Centro Asistencial para tratamiento inmediato.

Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia por 15 a 20 minutos, manteniendo los párpados bien levantados y separados. Si el afectado utiliza lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y continuar con el lavado normal hasta completar los 15 a 20 minutos. Obtenga atención médica si hay irritación.

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Obtenga atención médica si es necesario.

Inhalación: Traslade a la persona afectada a una zona fresca, seca y aireada. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Riesgos Ambientales: Tóxico a peces y fauna marina. Es de baja toxicidad a aves y abejas. No contamine cursos de agua "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

Instrucciones para el Triple Lavado: Una vez vacío el envase, agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. Luego perfóre el envase para evitar su reutilización.

Teléfonos de Emergencia: SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.: (56)228350500

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56)226353800 (**Atención las 24 horas**) CITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

SuMagic® 5 SC es un fitorregulador utilizado para disminuir el crecimiento vegetativo y mejorar la forma y calidad del fruto, favoreciendo el aumento de rendimiento en Paltos y Nogales.

SuMagic® 5 SC en Avellano Europeo controla el crecimiento vegetativo de la temporada siguiente.

SuMagic® 5 SC debe ser aplicado al suelo húmedo mediante el sistema de riego.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Objetivos	Dosis	Observaciones (*)
Palto	Disminuir el crecimiento vegetativo, Mejorar la forma y calidad del fruto	1,0 – 4,0 L/ha	Realizar la aplicación en verano, considerando el tipo de suelo y sistema de riego. Utilizar dosis superiores en suelos franco arcillosos con un sistema de riego por micro aspersión. Utilizar dosis inferiores en suelos de texturas liviana (franco arenoso) con un sistema de riego presurizado por goteo. Realizar una aplicación por temporada.
Nogal	Disminuir el crecimiento vegetativo, Mejorar la forma y calidad del fruto	0,5 – 2,0 L/ha	Realizar la aplicación al suelo mediante el sistema de riego, cuando el árbol esté con follaje activo, Diciembre. Utilizar dosis más alta en árboles jóvenes, menos frutal. Utilizar dosis más bajas en huertos en producción. El efecto de SuMagic® 5 SC , se observará la temporada siguiente. Realizar una aplicación por temporada.
Avellano Europeo	Disminuir el crecimiento vegetativo de la temporada siguiente	2, 0 L/ha	Realizar la aplicación al suelo mediante el sistema de riego, cuando el árbol esté en pleno crecimiento de brotes (mes de Diciembre). Realizar una aplicación por temporada

(*) Evitar su uso en árboles con problemas de Fitóftora (Phytophthora sp). No aplicar en árboles recién plantados.

Preparación de la mezcla: Disolver la cantidad necesaria de **SuMagic® 5 SC** en el estanque del equipo de riego y aplicar a través de éste.

Fitotoxicidad: **SuMagic® 5 SC**, no presenta fitotoxicidad cuando es utilizado según las recomendaciones de esta etiqueta.

Incompatibilidad: **SuMagic® 5 SC**, no presenta incompatibilidades, sin embargo se recomienda no aplicar junto con plaguicidas y productos fuertemente alcalinos.

Compatibilidad: Se recomienda aplicar **SuMagic® 5 SC** sólo. En caso de mezclas específicas consultar al Dpto Agrotécnico.

Periodos de Carencia: No corresponde.

Para cultivos de exportación respete las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso: Para personas 4 horas. Para animales no aplica dado que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Nota al Comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae a nuestro control directo.



CUIDADO

