

TERRANO 75 WP

HERBICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.616

TERRANO® 75 WP, es un herbicida selectivo de la familia de las sulfonilúreas, sistémico, que es absorbido por hojas y raíces y que es recomendado en trigo y lupino blanco para el control de malezas anuales de hoja ancha, mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Triasulfuron (*)	75% p/p (750 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100% p/p (1 kg)
(*) 1-[2-(2-cloroetoxi)fenilsulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2il)urea	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300

Providencia - Santiago

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903), Melchor Romero, La Plata

Provincia de Buenos Aires - Argentina

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.

17A Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road, Hangzhou 310004 - China

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

TERRANO® 75 WP

HERBICIDA

POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.616

TERRANO® 75 WP, es un herbicida selectivo de la familia de las sulfonilúreas, sistémico, que es absorbido por hojas y raíces y que es recomendado en trigo y lupino blanco para el control de malezas anuales de hoja ancha, mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Triasulfuron (*)	75% p/p (750 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100% p/p (1 kg)
(*) 1-[2-(2-cloroetoxi)fenilsulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2il)urea	

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300

Providencia - Santiago

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE

GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903), Melchor Romero, La Plata

Provincia de Buenos Aires - Argentina

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.

17A Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road, Hangzhou 310004 - China

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TERRANO® 75 WP es un herbicida cuyo ingrediente activo Triasulfuron, pertenece al grupo químico de las sulfonilúreas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del producto usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Durante una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< PARA APLICACIONES AÉREAS SE DEBEN RESPETAR LAS DISPOSICIONES QUE HAYA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

TERRANO® 75 WP es moderadamente tóxico para algas, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para peces y aves, virtualmente no tóxico para abejas.

**<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS >>**

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE

REINGRESO >>

**<< LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>**

Tratamiento médico de emergencia: El tratamiento es de tipo sintomático. En caso de contacto cutáneo: lave bien la zona contaminada con agua y jabón. En caso de contacto ocular: lave bien los ojos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte un especialista. En caso de inhalación: evalúe posibles irritaciones de las vías respiratorias que se manifiestan como tos o bronquitis. En caso de ingestión: diluir con mediana cantidad de agua, luego realice aspiración nasogástrica cuidadosa. Evalúe la real necesidad de un lavado gástrico. Solo si es necesario practique lavado gástrico con suero salino. Luego administre una suspensión de 30 gramos de carbón activado en una solución de 30 gramos de sulfato de sodio en 500 cc de agua. **Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Primeros auxilios:** Se solicita presentar la etiqueta del producto para cualquiera de los siguientes casos. **En caso de contacto con la piel:** Retire la ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y luego lave la piel con abundante agua de la llave. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con agua fría de la llave, manteniendo los párpados abiertos, por lo menos durante 15 minutos. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** Retirar al afectado del área expuesta y llevarlo al aire libre. Si no respira, darle respiración artificial. Solicitar asistencia médica. **En caso de ingestión:** NO PROVOCAR VOMITOS. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Solicitar asistencia médica. **En todos los casos** llevar al

afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **Síntomas de intoxicación:** Náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de electrolitos, disnea, pelo erizado y cuerpo doblado.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia:

(2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **TERRANO® 75 WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® **Marca registrada de AGRICOLA NACIONAL S.A.C.E.I.**



CUIDADO

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO

TERRANO® 75 WP es un herbicida selectivo de la familia de las sulfonilúreas, sistémico, que es absorbido por hojas y raíces y que es recomendado en trigo y lupino blanco para el control de malezas anuales de hoja ancha, mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de instrucciones de uso para aplicación terrestre:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (g/ha)	OBSERVACIONES
Trigo	Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Mostacilla (<i>Sisymbrium officinale</i>), Viola (<i>Viola arvensis</i>), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>), Pasto pinito (<i>Spergula arvensis</i>), Crepis (<i>Crepis capillaris</i>)	10	Aplicar en post emergencia temprana, con trigo entre 3 hojas e inicio de macolla. Para un óptimo resultado debe aplicarse con malezas en activo crecimiento, entre 2 y 4 hojas, con buena humedad de suelo.
Lupino blanco (<i>Lupinus albus</i>)	Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Pasto pinito (<i>Spergula arvensis</i>), Crepis (<i>Crepis capillaris</i>)	6	En Lupino blanco aplicar en post emergencia temprana, con plantas de lupino de aproximadamente 10 cm, entre 5 y 6 hojas.

Cuadro de instrucciones de uso para aplicación aérea:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (g/ha)	OBSERVACIONES
Trigo	Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>), Rábano (<i>Raphanus sativus</i>), Mostacilla (<i>Sisymbrium officinale</i>), Viola (<i>Viola arvensis</i>), Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>)	10	Aplicar en post emergencia temprana, con trigo entre 3 hojas e inicio de macolla. Para un óptimo resultado debe aplicarse con malezas en activo crecimiento, con menos de 4 hojas y con buena humedad de suelo.

Observaciones:

- En aplicaciones terrestres se recomienda utilizar un volumen de aspersión de 200 L/ha o superior, de manera de asegurar una adecuada cobertura y distribución del herbicida.
- En aplicaciones aéreas se recomienda aplicar con un volumen de agua de 20 a 40 L/ha.
- Para un mejor desempeño en trigo se recomienda mezclar **TERRANO® 75 WP** con aceites minerales como Winspray Miscible Coa o surfactantes. En lupino blanco no se recomienda.

• **TERRANO® 75 WP** no debe ser aplicado en condiciones de prolongada falta de humedad, en condiciones de estrés hídrico o de otro tipo, temperaturas extremas (bajas o altas), anegamiento o tamaño excesivo de malezas.

• Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario.

• Se recomienda no aplicar en suelos de pH alcalino.

• No aplicar más de 1 vez por temporada.

• No aplicar en siembras asociadas con leguminosas

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de **TERRANO® 75 WP**, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.

Incompatibilidad: Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad de las mezclas a utilizar, tanto física como del efecto sobre las plantas a tratar. Compatible con Ovassion 5.26 WP

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda esperar al menos 6 meses después de aplicar **Terrano® 75 WP** antes del siguiente cultivo de cereales, ballica, maíz, raps, lupino australiano o trébol blanco, en una resiembra o en una rotación. Para remolacha se debe respetar un intervalo de 10 meses y para otros cultivos se recomienda esperar un lapso mínimo de 24 meses.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado, tanto para personas como animales.

Periodo de carencia: no corresponde por el momento de aplicación.

Clasificación HRAC: Grupo B. Inhibidor de la Acetolactato sintasa (ALS).

CUIDADO



CUIDADO

