

SUGERENCIAS MANEJO AGRONÓMICO

Época de siembra

Zona	Fechas
Secano Interior	15 de mayo a 15 de junio
Valle Central	01 de junio a 30 de junio
Precordillera	15 de junio a 30 de julio

Dosis de siembra

Germinación (%)	PMG (g)	Población esperada (pl/m ²)	Dosis (kg/ha)
98	42,3	400	173
98	42,3	450	194
95	55,5	400	234
95	55,5	450	263

Fertilización nitrogenada

Para 270 – 280 unidades totales de Nitrógeno

SIEMBRA CON NITRÓGENO

Unidades (kg N/ha)	Detalles
46	Siembra (N considerado en la mezcla)
90	Inicio a mediados de macolla (Z 2.0 a 2.5)
90	Mediados a fines de macolla (Z 2.5 a 2.9)
46	Vaina engrosada "bota" (Z 4.0 a 4.9) - con buena humedad y sin exceso de temperatura

SIEMBRA SIN NITRÓGENO

Unidades (kg N/ha)	Detalles
46	Dos hojas (Z 1.2)
90	Inicio macolla (Z 2.1 a 2.2)
90	Fines de macolla a inicio de encañado (Z 2.9 a 3.1)
46	Vaina engrosada "bota" (Z 4.0 a 4.9) - con buena humedad y sin exceso de temperatura

SUGERENCIAS MANEJO AGRONÓMICO

Manejo Fitosanitario

Aplicación	Estado
Primera	Macolla (Z 2.0 a 2.9): Aplicación preventiva
Segunda	Inicio encañado (Z 3.0): Aplicación a condición o síntoma
Tercera	Hoja bandera o vaina engrosada (Z 3.9 a 4.3): Aplicación preventiva

*Aplicaciones preventivas son **obligatorias**.

*Aplicaciones a condición depende de **presión de la enfermedad** y clima.

*Recomendamos el uso de nuestros fungicidas

TYRONE
250EC

TYRONE
X-TRA

Reguladores de crecimiento

Tenedura	Aplicación	Estado	Dosis
Bajo riesgo	Una	Primer a segundo nudo (Z 3.0 a 3.4)	Belcocel 1 lt/ha + Armador 250 cc/ha
Alto riesgo	Dos	A fines de macolla (Z 2.9)	Belcocel 1 lt/ha + Armador 200 cc/ha
		En segundo nudo (Z 3.3 a 3.6)	

*Sugerimos utilizar mezcla de

Belcocel + **Armador**