

Un cerco que las malezas no podrán traspasar



En todas las etapas de desarrollo de sus ajos y cebollas, elimine las malezas con el trío más eficaz.



Para mayor información visite nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo del país o visítenos en www.anasac.cl

- **La Serena**
 (51) 290256 - 290257
- **San Felipe**
 (34) 510786 - 516405
- **Santiago**
 (2) 4869176
- **Rancagua**
 (72) 211555 - 214447
- **Talca**
 (71) 261364 - 261367
- **Chillán**
 (42) 276064 - 276066
- **Los Angeles**
 (43) 321767
- **Temuco**
 (45) 747000
- **Osorno**
 (64) 234817 - 231660

4/12
 Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
 La información aquí entregada es de carácter referencial.
 La información oficial está contenida en la etiqueta de cada producto.






► **Eficaz control de malezas en ajos y cebollas por un largo periodo de tiempo**

Anasac ha desarrollado una estrategia para el control de malezas en ajos y cebollas basada en dos productos residuales (Spectro-Tango) y un herbicida sistémico (Aquiles).


SPECTRO Herbicida residual y selectivo para el control de malezas anuales, de hoja ancha y angosta. Es absorbido por las raicillas y brotes de malezas en germinación. Su efecto residual va de los 60 a los 90 días aproximadamente.

TANGO Herbicida residual y de contacto para el control de malezas de hoja ancha y angosta. En pre-trasplante, forma una barrera química residual en la superficie del suelo provocando la muerte de las malezas durante su emergencia. En post-trasplante, actúa por contacto, impidiendo que las malezas jóvenes puedan establecerse. Su efecto residual, generalmente, es de más de 30 días.

AQUILES Herbicida sistémico y selectivo, recomendado en post-emergencia para el control de malezas de hoja angosta (anuales y perennes).



► Efecto de Spectro-Tango en el rendimiento de Cebolla, var. Calderana. Colina, Región Metropolitana.



Fuente: Consultora Cifra

► **Malezas controladas**



Hoja ancha	Gramíneas
Bledo	Hualcacho
Calabacillo	Pata Gallina
Duraznillo	Pega - pega
Pasto pinito	Piojillo o Poa
Pensamiento	
Porotillo	
Quingüilla	
Quilloy-Quilloy	
Sanguinaria	
Verdolaga	
Verónica	



Hoja ancha	Gramíneas
Bledo	Hualcacho
Bolsita del pastor	Pata Gallina
Chamico	Pega - pega
Duraznillo	Piojillo o Poa
Malva	
Manzanilla	
Ortiga	
Pichoga	
Quingüilla	
Quilloy-Quilloy	
Rábano	
Sanguinaria	
Tomatillo	
Verdolaga	
Yuyo	



Hoja angosta
Avena
Avenilla
Ballicas
Cebada
Cebadilla
Chépica
Hualcacho
Maicillo
Pasto cebolla
Pata de gallina
Pega - pega
Piojillo o Poa
Trigo

► **Programa Anasac para el control de malezas en Ajos y Cebollas**

Cebolla de trasplante	Cebolla de siembra directa	Ajo	Maleza	PRE-EMERGENCIA		POST-EMERGENCIA			
				PRE-SIEMBRA o PRE-TRASPLANTE	SIEMBRA o TRASPLANTE	ALMACIGO	TRASPLANTE	DESARROLLO BULBOS	MADUREZ
			Anuales de hoja angosta y ancha	SPECTRO + TANGO		15 días después del trasplante	30 días después del trasplante	45 días después del trasplante	
			Anuales principalmente hoja ancha				TANGO		
			Hoja angosta anuales y perennes						AQUILES
			Anuales de hoja angosta y ancha			desde 4 hojas verdaderas	15 días después y cada 15 días		
			Anuales principalmente hoja ancha				TANGO		
			Hoja angosta anuales y perennes						AQUILES
			Anuales de hoja angosta y ancha			1ª aplicación con cultivo establecido	cultivo establecido		
			Anuales principalmente hoja ancha				TANGO		
			Hoja angosta anuales y perennes						AQUILES

* Dosis según tipo de maleza presente, ver etiqueta.